

INFORMATIONS FOURNIES PAR LE MÉDECIN ALLERGOLOGUE

Nom : **Prénom :**

Date de naissance : **Poids :**

RENSEIGNEMENTS à renseigner par le médecin allergologue qui suit l'enfant

Bilan allergologique effectué le (*date*) :

L'enfant est allergique à (*préciser le ou les allergènes en cause*)

Aliments à exclure : œufs crus œufs cuits œufs mi-cuits
 arachide
 fruits à coque (*à préciser*)
 autres

Traces autorisées : oui non

L'enfant peut manger à la cantine avec substitution des allergènes par le service de restauration :
 oui non

L'enfant peut manger en restauration collective avec un repas préparé par la famille :
 oui non

ACTIVITÉS D'ARTS PLASTIQUES OU ATELIERS CUISINES

Contact cutané autorisé : oui non

Date :

Cachet et signature de l'allergologue :

PROTOCOLE D'URGENCE

à renseigner par le médecin allergologue qui suit l'enfant

Protocole destiné à la mise en œuvre de traitements d'urgence par des personnels non soignants sur le temps scolaire, périscolaire ou extra-scolaire.

COMPOSITION DE LA TROUSSE D'URGENCE (à cocher)		
<input type="checkbox"/> AERIUS <i>Desloratadine</i> <input type="checkbox"/> XYZALL <i>Levocétirizine</i> <input type="checkbox"/> KESTIN <i>Ebastine</i> <input type="checkbox"/> ZYRTEC <i>Cetirizine</i> <input type="checkbox"/> CÉLESTENE <i>Bétaméthasone</i>	SOLUPRED <i>Prednisolone</i> <input type="checkbox"/> 5mg <input type="checkbox"/> 10mg <input type="checkbox"/> 20mg <input type="checkbox"/> AIROMIR <i>Spray Salbutamol</i> <input type="checkbox"/> VENTOLINE <i>Spray Salbutamol</i> <ul style="list-style-type: none"> • Chambre d'inhalation <input type="checkbox"/> avec masque <input type="checkbox"/> avec embout buccal 	ANAPEN <input type="checkbox"/> 0,15mg <input type="checkbox"/> 0,30mg JEXT <input type="checkbox"/> 150 µg <input type="checkbox"/> 300 µg ÉPIPEN <input type="checkbox"/> 0,15mg <input type="checkbox"/> 0,30mg ÉMÉRADE <input type="checkbox"/> 150 µg <input type="checkbox"/> 300 µg

CONDUITE À TENIR EN CAS DE CRISE pendant ou juste après avoir mangé (jusqu'à 2h après le repas)

Signes d'appel	Conduite à tenir
<p><u>RÉACTION LÉGÈRE</u> Apparition d'au moins un des signes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La bouche et/ou les yeux et/ou la gorge qui pique ou gratte, le nez qui coule • Les lèvres gonflent • Des plaques rouges qui grattent • Un peu mal au ventre, envie de vomir • Autre : <p>MAIS IL PARLE ET RESPIRE BIEN</p> <hr/> <p>SI AGGRAVATION OU RÉACTION SÉVÈRE D'EMBLÉE Apparition d'au moins un des signes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extension des plaques rouges et/ou gonflement • La voix change • A du mal à parler • Respire mal, siffle, touse, oppression thoracique • Très mal au ventre, vomit • Se sent mal ou bizarre, il fait un malaise • Perte de connaissance • Autre : 	<p>1. <u>Donner</u> : (<i>case à cocher</i>)</p> <p><input type="checkbox"/> AERIUS <input type="checkbox"/> XYZALL <input type="checkbox"/> KESTIN <input type="checkbox"/> ZYRTEC Dose :</p> <p><input type="checkbox"/> SOLUPRED orodispersible <input type="checkbox"/> CÉLESTENE Dose :</p> <p style="text-align: center;">Surveiller l'enfant et prévenir les parents</p> <hr/> <p>2. <u>Injecter</u> (<i>case à cocher</i>)</p> <p><input type="checkbox"/> ANAPEN <input type="checkbox"/> ÉMÉRADE <input type="checkbox"/> ÉPIPEN <input type="checkbox"/> JEXT Appuyer sur la face <u>externe</u> de la cuisse et cliquer (<i>notice jointe</i>) <u>PUIS Appeler le centre 15 (112) et suivre leurs recommandations.</u></p> <p>3. <u>Aider à respirer en donnant</u> :</p> <p><input type="checkbox"/> VENTOLINE <i>Spray</i> <input type="checkbox"/> AIROMIR <i>Spray</i> Dose :</p> <p><input type="checkbox"/> SOLUPRED <input type="checkbox"/> CÉLESTENE Dose :</p> <p><input type="checkbox"/> AERIUS <input type="checkbox"/> XYZALL <input type="checkbox"/> KESTIN <input type="checkbox"/> ZYRTEC Dose :</p>

Date :

Cachet et signature de l'allergologue :


Fiche Technique

Modalités de l'injection de l'adrénaline selon la présentation du produit

ANAPEN



Enlever le capuchon noir protecteur de l'aiguille.



Retirer le bouchon noir protecteur.




Appuyer fermement le stylo sur la face extérieure de la cuisse.




Appuyer sur le bouton rouge
Maintenir appuyé 10 secondes.
Puis masser la zone d'injection.

L'injection est terminée lorsque l'indicateur d'injection est passé au rouge.
Sinon, recommencer l'injection avec un autre stylo.


EMERADE



Enlever le capuchon protecteur de l'aiguille.




Placer et appuyer le stylo contre la face externe de la cuisse.
Maintenir le stylo contre la cuisse pendant environ 5 secondes



Masser légèrement le site d'injection.


EPIPEN



Enlever la capsule bleue



Placer l'extrémité orange du stylo sur la face extérieure de la cuisse




Appuyer fermement la pointe orange sur la face externe de la cuisse jusqu'à entendre un déclic et maintenir appuyé pendant 10 secondes




Puis masser la zone d'injection

JEXT



Enlever le bouchon jaune.



Placer l'extrémité noire du stylo sur la face extérieure de la cuisse.



Appuyer fermement sur la face externe de la cuisse jusqu'à entendre un déclic et maintenir appuyé pendant 10 secondes.



Puis masser la zone d'injection.

Conseils d'utilisation d'une chambre d'inhalation

1. Retirer le capuchon du spray
2. Secouer le spray
3. Vérifier que la chambre ne contient aucun corps étranger
4. Tenir le spray verticalement, embout vers le bas et l'adapter sur la chambre
5. Déclencher le spray (**une dose à la fois**) dans la chambre en position horizontale
6. **Compter 10 inspirations/expirations** en maintenant une bonne étanchéité entre le masque et la bouche
7. Déclencher une seconde fois le spray et compter 10 inspirations/expirations
8. Répéter l'opération autant de fois que de bouffées prescrites

PROTOCOLE DU PANIER REPAS *

Les parents s'engagent à fournir :

- La totalité des composants du repas
- Les ustensiles (cloche plastique de protection) et couverts sur précision de l'allergologue (des couverts en plastiques jetables peuvent être envisagés)
- Les boîtes destinées à contenir les aliments
- La glacière ou le sac isotherme nécessaire au transport
- 2 sacs alimentaires plastiques : l'un pour le stockage, l'autre pour le retour

Préparation :

- Respecter les évictions alimentaires selon la prescription de l'allergologue
- Utiliser des produits frais, pouvant supporter la remise en température au four à micro-onde sur le plan gustatif, en respectant leur date de limite de consommation.
- Si les œufs sont autorisés, ne les proposer que durs. Supprimer mousse au chocolat maison, crème anglaise, crème chantilly, tout produit à base de lait cru. N'utiliser que des mayonnaises industrielles.
- Toujours se laver soigneusement les mains avant la préparation des repas

Conditionnement :

- Mettre les aliments dans des boîtes hermétiques susceptibles de supporter la remise en température au four micro-onde.
- Étiqueter les boîtes au nom de l'enfant.
- Mettre les boîtes, couverts et cloches en plastique identifiés dans un sac alimentaire plastique à usage unique étiqueté au nom de l'enfant.
- Dans le cas d'une préparation du repas la veille au soir, stocker le sac contenant le repas en le déposant immédiatement au réfrigérateur réglé entre 0 et + 4°C. Veiller à assurer la température adéquate de 0 à +4°C

Transport :

- Le sac contenant les boîtes sera transporté dans une glacière ou sac isotherme avec source de froid (bloc réfrigérant ou bouteille d'eau congelée). Respecter la chaîne du froid (ex : limiter la durée de séjour de la glacière dans la voiture).

Stockage dans l'établissement scolaire :

- Le sac à usage unique contenant les boîtes de nourriture sera déposé en chambre froide ou dans un réfrigérateur dont on s'assurera de la température adéquate (entre 0 et + 4°C maximum).
- Un emplacement spécifique clairement défini par étiquetage lui sera réservé
- Le sac ne sera ouvert qu'immédiatement avant le repas par la personne en charge de la remise en température.

Consommation :

- L'enfant ne consommera que les aliments fournis par la famille.
- Selon les accords, un repas froid peut être proposé. S'il existe un besoin de remise en température de l'aliment, celui-ci peut s'effectuer dans un four à micro-onde situé dans le réfectoire et non dans la cuisine. Celui-ci doit être nettoyé rapidement à l'intérieur avant utilisation immédiate.
- Réchauffer, sans transvasement, la boîte contenant les aliments recouverte d'une cloche plastique de protection (ou couvercle ou film plastique adapté au micro-onde),
- Il est rappelé de veiller au nettoyage de la table avant que l'enfant ne s'y installe.

Retour :

- La cloche et si besoin les couverts font l'objet d'un premier nettoyage sur place
- Rendre la cloche plastique et si besoin les couverts dans un deuxième sac.

En cas de survenue d'une réaction allergique au cours du repas : à titre exceptionnel, conserver le repas dans le deuxième sac alimentaire à déposer dans la glacière et rendre le tout à la famille pour enquête allergologique.

Un contrôle vétérinaire peut être effectué comme tout produit alimentaire sur la boîte à provisions à la demande du chef d'établissement.

**Compléments de propositions sur la base du protocole de la D.S.V de Paris et de la Seine-Saint-Denis et en référence aux informations données par les experts sollicités au cours de l'étude*

Annexes à imprimer selon besoin :

- mode d'emploi des ADRENALINES à imprimer si prescription médicale
- mode d'emploi d'une chambre d'inhalation
- protocole panier repas